

# BOLETÍN AMAZÓNICO

Vigilancia de las condiciones hidrológicas en la cuenca Amazónica  
Dirección de Hidrología – Subdirección de Predicción Hidrológica

ENERO - 2023

# Contenido

**1** Precipitación Acumulada **4**

---

**2** Anomalía de Precipitación **6**

---

**3** Monitoreo de Caudales **8**

---

**4** Pronóstico Hidrológico Mensual **9**

---

# Introducción

El presente Boletín informativo es elaborado por la **Dirección de Hidrología (DHI)**, como parte de la actividad de generación de Información y monitoreo de Condiciones Hidrológicas y Climáticas que realiza el SENAMHI en cumplimiento de Plan Operativo Institucional 2023. Esta nueva edición del Boletín cuenta con una identidad visual renovada, con el objetivo de llegar a sus lectores con información sintetizada y concisa.

En este ejemplar se presenta el análisis hidrometeorológico del periodo OCT-NOV-DIC, en los principales ríos de esta vasta región amazónica, en base a la información observada en las estaciones de medición que administra el SENAMHI. El análisis de la precipitación y caudales se ha realizado a paso de tiempo diario, para luego agregarlo a nivel mensual, obteniendo indicadores estadísticos e hidrogramas representativos en puntos de control hidrológico en la cuenca del río Amazonas, y otros tributarios.


**Dirección de Hidrología**  
**Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología**  
**Lima-Perú**

# Precipitación Acumulada - 1

Esta región se caracteriza por ser muy lluviosa con abundante precipitación durante todo el año. En esta sección se presenta el comportamiento de lluvias en el sector de la Selva Norte Alta y Baja, en términos de magnitud. Durante los meses de octubre y diciembre del 2022, la precipitación en esta región tiene una alta variabilidad espacio-temporal. En el mes de **octubre** se registró lluvias entre los 40.6 mm/mes a 316.4 mm/mes. Por otro lado, la mayor tormenta registrada se produjo en la provincia de Requena con 100.4 mm en un día.



## Selva Norte Alta

San Martín, Estación Pongo de Caynarachi  
Hietograma - mm/d



## Selva Norte Baja

Loreto, Estación Punchana  
Hietograma - mm/d



### Precipitación (mm/mes)


- 41 - 114
- 114 - 155
- 155 - 190
- 190 - 251
- 251 - 338

\*Fuente: DMA-SENAMHI.

Por otro lado para el mes de **diciembre**, se registró lluvias entre los 25.9 mm/mes a 319.2 mm/mes, la mayor tormenta registrada se produjo en el distrito de Huimbayoc, provincia de San Martín, San Martín con 90.8 mm en un día.



## Selva Norte Alta

San Martín, Estación Pucallpa - Huimbayoc  
Hietograma - mm/d



## Selva Norte Baja

Loreto, Estación Santa Rosa  
Hietograma - mm/d



DICIEMBRE


## Precipitación (mm/mes)

- 26 - 42
- 62 - 95
- 95 - 139
- 139 - 194
- 194 - 319

\*Fuente: DMA-SENAMHI.


## 2 - Anomalía de Precipitación

En esta sección se presenta el comportamiento de luvias en el sector de la Selva Norte Alta y Baja, en términos de la anomalía de precipitación mensual. Una anomalía es la variación del valor de una variable meteorológica respecto a su valor normal o climático.



\*Fuente: DMA-SENAMHI.

Durante el mes de **diciembre**, se registró principalmente lluvias muy por debajo de su normal (periodo muy seco) en el sector noreste, respecto a la zona suroeste registro un comportamiento en promedio ligeramente por debajo de su normal (periodo seco). Se reportó anomalías porcentuales de precipitación en el rango de -81% a 373%.





En el presente periodo de análisis podemos observar que en los meses de octubre a diciembre los ríos de la vertiente de la Zona Norte como lo son Marañón y Amazonas registran en promedio tendencias fluctuantes en sus caudales para el cuarto trimestre del 2022.

El río Marañón en la estación Borja registro caudales medios mensuales que fluctuaron entre 1805 m<sup>3</sup>/s y 8370 m<sup>3</sup>/s, de igual forma en el río Amazonas en la estación Tamshiyacu se registraron caudales medios mensuales que fluctuaron entre 10588 m<sup>3</sup>/s y 23410 m<sup>3</sup>/s. Cabe mencionar que la ausencia de estaciones hidrológicas para este boletín está sujeto a la disponibilidad operativa que actualmente maneja la dirección zonal de Loreto.

**Río Marañón**

Loreto, Estación Borja  
Hidrograma de Caudales - m<sup>3</sup>/s



**Río Amazonas**

Loreto, Estación Tamshiyacu  
Hidrograma de Caudales - m<sup>3</sup>/s



Los caudales de los principales ríos de la vertiente amazónica en las estaciones hidrológicas Tamshiyacu y Borja fueron analizados hasta fines del mes de diciembre, la principal estación de la cuenca del Río Huallaga - Est. Chazuta temporalmente no esta registrando valores.




## 4 - Pronóstico Hidrológico Mensual

Según los pronósticos hidrológicos para el próximo trimestre Ene-Feb-Mar del 2023 en la estación Tamshiyacu estarían fluctuando valores entre 21860 m<sup>3</sup>/s a 56100 m<sup>3</sup>/s en promedio con una tendencia ligeramente ascendente para el siguiente trimestre, para la estación Bellavista se tendrían valores que estarían fluctuando entre 1201 m<sup>3</sup>/s a 9975 m<sup>3</sup>/s en promedio con una tendencia estable a ligeramente ascendente, para la estación Borja se estarían registrando para los próximos meses caudales que estarían fluctuando entre los 3170 m<sup>3</sup>/s a 9637 m<sup>3</sup>/s en promedio con una tendencia estable a ligeramente ascendente en promedio.

Esta información contiene los pronósticos de caudales a escala mensual utilizando el modelo GloFAS (Global Flood Awareness System) en las estaciones Tamshiyacu, Borja y Bellavista los cuales vienen siendo implementados desde enero del 2020 en el SENAMHI.



### Río Marañón

Loreto, Estación Borja  
Hidrograma de Caudales - m<sup>3</sup>/s



### Río Napo


Loreto, Estación Bellavista  
Hidrograma de Caudales - m<sup>3</sup>/s



GloFAS es un modelo hidrológico desarrollado en conjunto por la Comisión Europea y el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF). Este sistema produce pronósticos de inundaciones diarias en forma pre-operativa desde junio 2011 y ha mostrado su potencial durante las inundaciones en Pakistán en agosto de 2013 y en Sudán en setiembre 2013. En su fase de prueba este sistema de previsión global fue capaz de predecir inundaciones hasta dos semanas de antelación.

### Río Amazonas

Loreto, Estación Tamshiyacu  
Hidrograma de Caudales - m<sup>3</sup>/s



Para más información sobre el presente boletín por favor contactar con:

Dirección de Hidrología  
[hidrologia\\_dgh@senamhi.gob.pe](mailto:hidrologia_dgh@senamhi.gob.pe)

Director de la Dirección de Hidrología  
Oscar Felipe Obando  
[ofelipe@senamhi.gob.pe](mailto:ofelipe@senamhi.gob.pe)

Subdirector de la Subdirección de Predicción Hidrológica (SPH)  
Luis Metzger Terrazas  
[lmetzger@senamhi.gob.pe](mailto:lmetzger@senamhi.gob.pe)

Subdirector de la Subdirección de Estudios e Investigaciones Hidrológicas (SEH)  
Waldo Lavado Casimiro  
[wlavado@senamhi.gob.pe](mailto:wlavado@senamhi.gob.pe)

Instituto de la Investigación para el desarrollo de Francia (IRD) - Programa HYBAM  
William Santini  
[william.santini@ird.fr](mailto:william.santini@ird.fr)

Redacción, Compilación y Figuras

Nilton Fuertes Melchor (SPH)  
Jhonatan Pérez Arévalo (DZ8)



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú  
SENAMHI

Jr. Cahuide 785, Jesús María  
15702 Perú

Central telefónica: 511+ 614-1414

Atención al Cliente: 511+ 470-2567

Dirección de Hidrología: 511+ 6141414 anexo 465

Consultas y Sugerencias:  
[hidrologia\\_dgh@senamhi.gob.pe](mailto:hidrologia_dgh@senamhi.gob.pe)



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

EL PERÚ PRIMERO