


Enero 2021

INFORME
**Vigilancia de la
calidad del aire**
Área Metropolitana de
Lima y Callao



industrias

parque
automotor



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LIMA Y CALLAO (AMLC) – ENERO 2021

PRESENTACIÓN

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) presenta el informe mensual sobre la vigilancia de la calidad del aire en el Área Metropolitana de Lima y Callao (AMLC), en el cual los tomadores de decisión y público en general podrán encontrar información sobre los principales contaminantes atmosféricos al que se encuentran expuestos.

Para un mejor entendimiento de las variaciones espaciales y temporales de los contaminantes atmosféricos, se ha utilizado información meteorológica de superficie (datos de las estaciones meteorológicas automáticas del SENAMHI) e información de reanálisis¹ del Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP por sus siglas en inglés), del Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR por sus siglas en inglés) y del producto ERA5 del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo (ECMWF, por sus siglas en inglés). Asimismo, se utilizó datos de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) del Servicio Meteorológico del Reino Unido, que corresponden al sistema de Análisis Operativo de la Temperatura Superficial del Mar y del Hielo Marino (OSTIA, por sus siglas en inglés). Para determinar el porcentaje de actividad vehicular durante el mes de enero en el AMLC, se utilizó información de la aplicación Moovit². Con respecto a la información de contaminantes del aire, se usaron los datos de la Red de Monitoreo Automático de la Calidad del Aire (REMCA) de SENAMHI.

*Toda persona tiene derecho de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
Constitución Política del Perú. Artículo 2, inciso 22.*

-
1. Conjunto de datos de la atmósfera actualizados "permanentemente" y generados a partir de observaciones en superficie y resultados de modelos meteorológicos.
 2. Moovit Insights (2020). Datos y estadísticas de uso del transporte público en Lima, Perú. Recuperado de: https://moovitapp.com/insights/es/Moovit_Insights_%C3%8Dndice_de_Transporte_P%C3%BAblico-countries.


1. VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES SINÓPTICAS Y METEOROLÓGICAS LOCALES EN EL AMLC

Para un mejor entendimiento de las condiciones sinópticas y meteorológicas locales en el AMLC, se realizó un análisis por decadiarias (cada diez días), obteniéndose tres periodos de análisis. Es así que, para el mes de enero se conformó la decadiaria 1 (del 1 al 10), decadiaria 2 (del 11 al 20) y decadiaria 3 (del 21 al 31).

1.1. COMPORTAMIENTO DEL ANTICICLÓN DEL PACÍFICO SUR (APS)

En la decadiaria 1 se observó que el Anticiclón del Pacífico Sur (APS) presentó valores de presión atmosférica por encima de su normal³ y se posicionó en los 35°S (figura N°01a). Asimismo, en la decadiaria 2 se apreció que el APS tuvo valores de presión atmosférica por encima de su normal, aunque disminuyó de intensidad con respecto a la decadiaria 1, acercándose al continente (figura N°01b). Finalmente, en la decadiaria 3, el APS presentó valores de presión atmosférica dentro de su normal, disminuyendo de intensidad con respecto a la decadiaria 2 (figura N°01c).

Figura N° 01. Promedio decadiario de la presión atmosférica (hPa) a nivel del mar.



1.2. LÍNEAS DE CORRIENTE (FLUJOS DE VIENTOS) A DIFERENTES NIVELES DE PRESIÓN


El comportamiento de las líneas de corriente (flujos de vientos) y la divergencia (cambios en los flujos de vientos por su dirección y/o velocidad) a diferentes niveles de presión (alturas sobre la superficie; niveles altos - 200 hectopascales (hPa), niveles medios - 500 hPa y niveles bajos - 850 hPa) sobre Sudamérica son mostrados en la figura N°2. Durante la decadiaria 1 se tuvo flujos de vientos descendentes desde niveles altos hacia la superficie (divergencia negativa en 200 hPa, y divergencia positiva en 500 hPa y 850 hPa), favoreciendo a la estabilidad atmosférica (figura N°02a).

En la decadiaria 2 se apreció flujos de vientos descendentes desde niveles altos hacia la superficie (divergencia negativa en 200 hPa, y divergencia positiva en 500 hPa y 850 hPa), condiciones bastante similares a la decadiaria 1 (figura N°02b). Finalmente, en la decadiaria 3, se observó condiciones similares a la decadiaria 2 (figura N°02c). Estas condiciones anteriormente descritas

3. Normal, se refiere al promedio histórico de 30 años de información (1981-2010)

generarían condiciones de cielo despejado, por lo cual favorecería al incremento de la temperatura y disminución de la humedad relativa.


Figura N° 02. Decadarias de las líneas de corriente (m/s) y divergencia ($s^{-1} \cdot 10^{-6}$) a diferentes niveles de presión.



1.3. CONDICIONES METEOROLÓGICAS LOCALES EN EL AMLC

Utilizando datos de reanálisis ERA5 del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo (ECMWF, por sus siglas en inglés) con énfasis en el Área Metropolitana de Lima y Callao (AMLC) se evaluó la diferencia entre la velocidad del viento (a 10 metros de la superficie - mds) en cada decadiaria del mes de enero 2021 (DECA) con respecto a su promedio mensual para enero 2021 (PVV) mostrado en la figura N° 03. Es así que, en la decadiaria 1 se observó un aumento de la velocidad del viento costero (figura N°03a), lo que favorecería a días con ingreso de sales marinas; mientras que en la decadiaria 2 se observó una disminución de la velocidad del viento costero (figura N°03b). Finalmente, en la decadiaria 3 se apreció que la velocidad del viento costero disminuyó aún más con respecto a la decadiaria 2, lo cual estaría asociado al debilitamiento del APS (figura N°03c).

Figura N° 03. Decadiaria de la velocidad del viento a 10 mds (m/s) en el AMLC indicado en flechas.




Con los datos de las estaciones meteorológicas automáticas (EMA) ubicadas en el AMLC, se realizó un análisis de la variabilidad diaria de la humedad relativa (a 2 metros de la superficie - mds), temperatura (a 2 mds) y la velocidad del viento (a 10 mds). Los datos provinieron de las estaciones: Antonio Raimondi (AR), Carabaylo (CRB), San Martín de Porres (SMP), San Juan de Lurigancho (SJL), Alexander Von Humboldt (VH), Villa María del Triunfo (VMT), Campo de Marte (CDM) y Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (JCH). Adicionalmente se representó la variabilidad diaria de la capa límite atmosférica (ACLA)⁴ para lo cual se usó datos de reanálisis ERA5.

Con respecto a la humedad relativa (figura N°04a), se observó una disminución pronunciada los días 03, 06, 08, 10, 13, 17, 19, 22, 24, 26, 29 y 31, mientras que los días 02, 05, 07, 09, 11, 14, 18, 20, 23, 27 y 30 mostraron un incremento. Así mismo, la temperatura mostró un comportamiento opuesto a la humedad relativa, presentando tendencias de incremento los días de menor humedad y tendencias de disminución los días de mayor humedad (figura N°04b). Por otro lado, la velocidad del viento presentó disminuciones los días 03, 05, 07, 09, 12, 14, 18, 23, 27 y 30, mientras que los días 02, 04, 06, 08, 10, 13, 17, 20 y 25 mostraron un incremento (figura N°04c). Asimismo, la ACLA presentó mayores alturas en la estación AR y menores alturas en la estación VMT. De esta manera, se observó incrementos de ACLA los días 10, 15, 17, 21, 27, 29 y 31, y disminución los días 04, 07, 12, 16, 19, 24, 28 y 30 (figura N°04d).

4. ACLA: parte de la tropósfera influenciada directamente por la superficie terrestre, donde se concentra la mayor cantidad de sustancias contaminantes.

En promedio los valores de la temperatura presentaron una tendencia a aumentar en la decadiaria 3, asociado a la estación del verano. Asimismo, dentro de esta decadiaria, también se observaron valores mínimos de la humedad relativa. En el caso de la velocidad del viento, este estaría asociado al debilitamiento del viento costero durante los últimos días del mes (mencionado en el análisis inicial de la sección 1.3).

Figura N° 04. Variación diaria de las variables meteorológicas en el ALMC.



Con respecto al comportamiento horario de la base de la nube (m) registrada en la EMA Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ubicada en el Callao (figura N°05), se observó que las nubes bajas (base de la nube menor a 2000 m) tuvieron mayor presencia durante casi todo el mes. Mientras que la presencia de nubes medias (base de la nube mayor a 2000 m y menor a 6000 m) fue observada en algunos días del mes y la presencia de nubes altas (base de la nube mayor a 6000 m) fue casi nula.

La discontinua presencia de nubes bajas y medias establecería varios días con cielo despejado debido a la estabilidad atmosférica (mencionado en la sección 1.2), lo cual es característico de la estación de verano.

Figura N° 05. Altura de la base de nube (m) registrada en la estación Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (JCH).




Figura N° 07. Rosas de viento para el horario diurno en el AMLC.




Figura N° 08. Rosas de viento para el horario vespertino en el AMLC.




Figura N°09. Rosas de viento para el horario nocturno en el AMLC.



Las figuras N° 07, 08 y 09, muestran el comportamiento de la dirección y velocidad del viento en cada una de las estaciones meteorológicas automáticas para los horarios diurnos (07:00 - 11:59 horas), vespertinos (12:00 - 18:59 horas) y nocturnos (19:00 - 06:59 horas).

2. RED DE MONITOREO AUTOMÁTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL AMLC

El SENAMHI realiza la vigilancia a través de una Red de Monitoreo Automático de la Calidad del Aire (REMCA), la cual mide las concentraciones horarias de los contaminantes PM₁₀ (material particulado menor a 10 micras), PM_{2.5} (material particulado menor a 2.5 micras), NO₂ (dióxido de nitrógeno), O₃ (ozono troposférico) y CO (monóxido de carbono).

Cuadro N° 01. Zonas, nombres y ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire.

| ZONA | NOMBRE/UBICACIÓN |
|--------|--|
| Norte | Estación Puente Piedra (PPD) Complejo Municipal "El gallo de oro" del distrito de Puente Piedra |
| | Estación Carabayllo (CRB) Piscina Municipal del distrito de Carabayllo |
| | Estación San Martín de Porres (SMP) Parque Ecológico del distrito de San Martín de Porres |
| Este | Estación San Juan Lurigancho (SJL) Universidad César Vallejo en el distrito de San Juan de Lurigancho |
| | Estación Ate (ATE) Plaza de Amas del distrito de Ate |
| | Estación Ceres (ATE2) Plaza Cívica de Ceres del distrito de Ate |
| | Estación Santa Anita (STA) Palacio Municipal del distrito de Santa Anita |
| Sur | Estación Villa María del Triunfo (VMT) Parque Nueva Esperanza en el distrito de Villa María del Triunfo |
| Centro | Estación San Borja (SBJ) Polideportivo Limatambo del distrito de San Borja |
| | Estación Campo de Marte (CDM) Parque Campo de Marte en el distrito de Jesús María. |

Figura N° 10. Ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en el AMLC.



Estándar de Calidad Ambiental (ECA)


La Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente define al estándar de calidad ambiental (ECA) como **"la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el aire, agua y suelo en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente"**. Por lo tanto, para el caso de los contaminantes del aire, las concentraciones de cada uno de estos no deben superar su respectivo Estándar de Calidad Ambiental para Aire (ECA-aire) a fin de evitar problemas en la salud de las personas y el ambiente. Asimismo, los valores de los ECA-aire son establecidos por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y estipulados en el D.S. N° 003-2017-MINAM.

3. ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LIMA Y CALLAO

Moovit es una aplicación que muestra cómo se desplazan las personas cada día en transporte público en Lima Metropolitana, en comparación con otras ciudades del mundo. Esta aplicación determina el promedio de tiempo de viaje y de espera de los usuarios, así como también la distancia que el usuario viaja para llegar a trabajar en transporte público. Moovit utiliza algoritmos avanzados de Big Data para realizar cálculos estadísticos con la información obtenida de OpenStreetMap (también conocido como OSM), el cual genera mapas editables y libres con información geográfica capturada con dispositivos GPS móviles y ortofotografías.

En la figura N°11 se observa una tendencia creciente en la actividad vehicular en la decadiaria 1. Asimismo, en la decadiaria 2 se observa los mayores registros de la actividad vehicular, sin embargo, presenta una tendencia decreciente. Mientras que en decadiaria 3 se observa una fuerte tendencia decreciente de la actividad vehicular hasta el día 28, luego de ese periodo se observa una tendencia creciente. Cabe mencionar que, un alto porcentaje de la actividad vehicular está estrechamente relacionado con el aumento de emisiones de contaminantes del aire, mientras que un bajo porcentaje de éstas, se relaciona a una disminución de emisiones.

Figura N° 11. Porcentaje de transporte público en el AMLC.



4. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE A TRAVÉS DE ESTACIONES DE MONITOREO EN EL AMLC


Con los datos de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire ubicadas en el AMLC, se realizó un análisis de la variabilidad diaria y/o horaria de las concentraciones del PM₁₀, PM_{2.5}, NO₂, O₃ y CO. Los datos provinieron de las estaciones: Carabayllo (CRB), San Martín de Porres (SMP), San Juan de Lurigancho (SJL), Santa Anita (STA), Villa María del Triunfo (VMT), San Borja (SBJ) y Campo de Marte (CDM).

4.1. CONCENTRACIONES DIARIAS DEL PM₁₀

En la figura N° 12 se observa que la concentración diaria registrada en la estación no superó el ECA-aire para PM₁₀ (100 µg/m³ como promedio diario) durante los días monitoreados. Asimismo, se pudo apreciar lo siguiente:

- **Zona Este:** En la estación Santa Anita (STA) la concentración máxima fue 84.58 µg/m³ (martes 26) y la mínima fue de 44.62 µg/m³ (domingo 10).
- **Zona Centro:** En la estación Campo de Marte (CDM) la concentración máxima fue 19.95 µg/m³ (jueves 14) y la mínima fue de 10.20 µg/m³ (sábado 02).

Figura N° 12. Variación diaria del PM₁₀ (µg/m³) en el AMLC.




Asimismo, se observó en promedio una disminución de las concentraciones de PM₁₀ en la decadiaria 1, lo que estuvo relacionado a factores meteorológicos como disminución de las temperaturas y a un incremento de la altura de capa límite atmosférica durante los primeros días (mencionado en la sección 1.3). En la decadiaria 2, se apreció un incremento de las concentraciones de PM₁₀ los días 12 y 16, lo cual estaría asociada a una disminución de la altura de la capa límite atmosférica (mencionado en la sección 1.3). En la decadiaria 3, se observó en promedio un ligero incremento de las concentraciones de PM₁₀, lo que estuvo relacionado al incremento de las temperaturas y a una disminución de la altura de capa límite atmosférica los días 21, 22, 23, 24 y 25 (mencionado en la sección 1.3).

Las concentraciones más bajas fueron alcanzadas los días 02 (sábado), 10 (domingo), 17 (domingo) y 22 (viernes), los cuales podría atribuirse a un incremento de altura de la capa límite atmosférica (mencionado en la sección 1.3).

En la figura N° 13 se presenta la variación diaria en la semana de las concentraciones del PM₁₀ históricas (periodo 2015 - 2019) para enero y el periodo de estado de emergencia (enero 2021), donde se ha observado que la estación Santa Anita (STA) mostró un incremento del 7% (figura N° 13a), mientras que la estación Campo de Marte (CDM) mostró una disminución de 42% (figura N° 13b). En promedio se registró una disminución de 19%.

Figura N° 13. Comparativo de las concentraciones históricas y las registradas durante el estado de emergencia para el PM₁₀.




4.2. CONCENTRACIONES DIARIAS DEL PM_{2.5}

En la figura N° 14 se observa que las concentraciones diarias registradas en las estaciones no superaron el ECA-aire para PM_{2.5} (50 µg/m³ como promedio diario) durante los días monitoreados. Asimismo, se pudo apreciar lo siguiente:

- **Zona norte:** En la estación Carabaylo (CRB) la concentración máxima fue 24.03 µg/m³ (sábado 30) y la mínima fue de 12.06 µg/m³ (domingo 03).
- **Zona este:** En la estación San Juan de Lurigancho (SJL) la concentración máxima fue 27.98 µg/m³ (martes 12) y la mínima fue de 13.19 µg/m³ (domingo 03).
- **Zona centro:** En la estación Campo de Marte (CDM) la concentración máxima fue 14.80 µg/m³ (martes 12) y la mínima fue de 6.64 µg/m³ (domingo 03).

Figura N° 14. Variación diaria del PM_{2.5} (µg/m³) en el AMLC.




En la decadiaria 1 se observó un ligero incremento de las concentraciones del PM_{2.5} (principalmente los últimos días), lo que estuvo relacionado a la disminución de la altura de la capa límite atmosférica (mencionado en la sección 1.3) y al incremento de la actividad vehicular en los últimos días (mencionado en la sección 3). En la decadiaria 2, existió en promedio un incremento de las concentraciones de PM_{2.5}, lo que estuvo asociado a un incremento de la actividad vehicular los primeros días (mencionado en la sección 3). Mientras que, en la decadiaria 3 se observa en promedio una ligera disminución de las concentraciones de PM_{2.5}, debido a factores meteorológicos como incremento de temperatura y disminución de la humedad relativa (mencionado en la sección 1.3) y disminución de la actividad vehicular los primeros días (mencionado en la sección 3).

Además de lo ya explicado, los días 03 (domingo), 10 (domingo) 17 (domingo) y 22 (viernes) se registró las concentraciones más bajas del PM_{2.5}, lo cual estuvo asociado al incremento de las temperaturas y al aumento de la altura de la capa límite atmosférica (mencionado en la sección 1.3).

En la figura N° 15 se presenta la variación diaria en la semana de las concentraciones del PM_{2.5} históricas (periodo 2015 - 2019) para enero y el periodo de estado de emergencia (enero 2021), donde se ha observado que la estación Carabayllo (CRB) mostró una disminución de 31% (figura N° 15a), San Juan de Lurigancho (SJL) una disminución de 15% (figura N° 15b), mientras que la estación Campo de Marte (CDM) mostró un incremento de 2% (figura N° 15c). En promedio se registró una disminución de 14%.

Figura N° 15. Comparativo de las concentraciones históricas y las registradas durante el estado de emergencia para el PM_{2.5}.




4.3. CONCENTRACIONES HORARIAS DEL NO₂

En la figura N° 16 se observa que las concentraciones horarias registradas en las estaciones no superaron el ECA-aire para NO₂ (200 µg/m³ como promedio de una (01) hora) durante los días monitoreados. Asimismo, se pudo apreciar lo siguiente:

- **Zona norte:** En la estación Carabayllo (CRB) la concentración máxima fue 103.60 µg/m³ (viernes 22 a las 09:00 horas) y la mínima fue de 2.70 µg/m³ (lunes 04 a las 05:00 horas) y en la estación San Martín de Porres (SMP) la concentración máxima fue 39.70 µg/m³ (sábado 30 a las 13:00 horas) y la mínima fue de 1.90 µg/m³ (martes 12 a las 05:00 horas).
- **Zona sur:** En la estación Villa María del Triunfo (VMT) la concentración máxima fue 80.60 µg/m³ (lunes 18 a las 19:00 horas), mientras que la mínima fue de 14.60 µg/m³ (jueves 21 a las 04:00 horas).

Figura N° 16. Variación horaria del NO₂ (µg/m³) en el AMLC.




Durante el mes de enero, las mayores concentraciones del NO₂ se registraron en los horarios de mayor actividad vehicular (horas pico), las cuales están comprendidas en las primeras horas del día (7:00 horas hasta las 12:00 horas) y primeras horas de la noche (desde las 18:00 y 21:00 horas). Asimismo, las mayores concentraciones registradas en las estaciones de Carabayllo y Villa María del Triunfo fueron en la decadiaria 2, mientras que en la estación San Martín de Porres fue en la decadiaria 3.

El incremento de las concentraciones del NO₂ registradas durante la decadiaria 2, estarían asociadas principalmente al incremento de la actividad vehicular (89% de las emisiones de NO_x provienen de vehículos a diésel⁵; mencionado en la sección 3).

En la figura N° 17 se presentan las variaciones horarias de las concentraciones del NO₂ históricas (periodo 2015 al 2019) para enero y el periodo de estado de emergencia (enero 2021), donde se observó que la estación Carabayllo (CRB) mostró un incremento de 3%, mientras que la estación San Martín de Porres (SMP) mostró una disminución de 38%. En promedio se registró una reducción de 21%.

5. Documento: Informe N° 00283-2019-MINAM/VMGA/DGCA/DCAE – “Diagnóstico de la Gestión de la Calidad del Aire de Lima y Callao”.

Figura N° 17. Comparativo entre las concentraciones históricas y las registradas durante el estado de emergencia para el NO₂




4.4. CONCENTRACIONES HORARIAS (PROMEDIO MÓVIL DE 8 HORAS) DEL O₃

En la figura N° 18 se observa que las concentraciones horarias (promedio móvil de 8 horas) registradas en las estaciones no superaron el ECA-aire para O₃ (100 µg/m³) durante los días monitoreados. Asimismo, se pudo apreciar lo siguiente:

- **Zona Norte:** En la estación Carabayllo (CRB) la concentración máxima fue 29.16 µg/m³ (jueves 21 a las 16:00 horas) y la mínima fue 2.60 µg/m³ (viernes 15 a las 05:00 horas).
- **Zona Este:** En la estación San Juan de Lurigancho (S JL) la concentración máxima fue 44.21 µg/m³ (martes 12 a las 17:00 horas) y la mínima fue 4.00 µg/m³ (martes 05 a las 04:00 horas).
- **Zona Centro:** En la estación Campo de Marte (CDM) la concentración máxima fue 33.45 µg/m³ (sábado 16 a las 18:00 horas) y la mínima fue 6.98 µg/m³ (lunes 25 a las 05:00 horas).

Figura N° 18. Variación horaria (promedio móvil de 8 horas) del O₃ (µg/m³) en el AMLC.




Durante el mes de enero, las mayores concentraciones del O₃ en el AMLC se registraron en los horarios posteriores al periodo de máxima radiación solar⁶ (comprendido entre las 11:00 horas y 15:00 horas). Asimismo, las mayores concentraciones registradas en las estaciones San Juan de Lurigancho y Campo de Marte fueron en la decadiaria 3, mientras que en la estación Carabayllo fue en la decadiaria 2.

La formación de ozono en la decadiaria 3 se vio condicionada al incremento de las temperaturas (mencionado en la sección 1.3), lo que generó una ligera disminución de las concentraciones de NO₂ (mencionado en la sección 4.3).

En la figura N° 19 se presentan las variaciones horarias de las concentraciones del O₃ históricas (periodo 2015 al 2019) para enero y el periodo de estado de emergencia (enero 2021), donde se observó que la estación Carabayllo (CRB) mostró una disminución de 58%, mientras que la estación San Juan de Lurigancho (SJL) mostró un incremento de 6%. En promedio se registró una reducción de 27% para las 2 estaciones.

Figura N° 19. Comparativo entre las concentraciones históricas y las registradas durante el estado de emergencia para el O₃




4.5. CONCENTRACIONES HORARIAS DEL CO

En la figura N° 20 se observa que las concentraciones horarias registradas en las estaciones no superaron el ECA-aire para el CO (30 000 µg/m³) durante los días monitoreados. Asimismo, se pudo apreciar lo siguiente:

- **Zona Norte:** En la estación Carabayllo (CRB) la concentración máxima fue 1230.50 µg/m³ (sábado 16 a las 10:00 horas) y la mínima fue 92.00 µg/m³ (jueves 21 a las 04:00 horas) y en la estación San Martín de Porres (SMP) la concentración máxima fue 1188.90 µg/m³ (lunes 25 a las 08:00 horas) y la mínima fue 420.90 µg/m³ (sábado 02 a las 03:00 horas).
- **Zona Este:** En la estación San Juan de Lurigancho (SJL) la concentración máxima fue 2278.10 µg/m³ (viernes 29 a las 11:00 horas) y la mínima fue 431.20 µg/m³ (viernes 01 a las 05:00 horas).
- **Zona Sur:** En la estación Villa María del Triunfo (VMT) la concentración máxima fue 1996.40 µg/m³ (lunes 25 a las 11:00 horas) y la mínima fue 794.30 µg/m³ (jueves 21 a las 02:00 horas).

6. Documento: Boletín Mensual de la Vigilancia de la Radiación UV en ciudades del Perú – enero 2021.

Figura N° 20. Variación horaria del CO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) en el AMLC.



Durante el mes de enero, las mayores concentraciones del CO se registraron en la primera hora pico del AMLC (06:00 horas hasta las 12:00 horas). Asimismo, las concentraciones horarias registradas en las decadiarias 2 y 3 son ligeramente mayores en comparación a las decadiaria 1.

El incremento de las concentraciones del CO registradas durante la decadiaria 2, estarían asociadas principalmente al incremento de la actividad vehicular, principalmente los primeros días (87% de las emisiones de CO provienen de los vehículos a gasolina/gasohol⁷; mencionado en la sección 3).

7. Documento: Informe N° 00283-2019-MINAM/VMGA/DGCA/DCAE – “Diagnóstico de la Gestión de la Calidad del Aire de Lima y Callao”.

5. ESTADO DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA EL AMLC

El índice de calidad del aire (ICA), está basado en valores establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US-EPA por sus siglas en inglés). Los ICAs son valores que permiten informar el estado de la calidad del aire, permitiendo a la población conocer sobre qué tan limpio o saludable está el aire y que efectos podría causar en la salud (Cuadro N°2).

Cuadro N° 02: Estados de la Calidad del Aire y su Implicancia en las personas.


| ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE | ESTADO | PM ₁₀ (µg/m ³) 24-horas | PM _{2.5} (µg/m ³) 24-horas | ¿QUIÉN SE DEBE PREOCUPAR? | MEDIDAS A TOMAR POR LA POBLACIÓN |
|----------------------------|---------------------------------|--|---|--|---|
| 0 – 50 | BUENA | 0 - 54 | 0.0 –12.0 | Ninguno, No existe riesgo | La calidad del aire es aceptable se puede realizar actividades al aire libre |
| 51 – 100 | MODERADA | 55 - 154 | 12.1 - 35.4 | Personas que podrían ser excepcionalmente sensibles a la contaminación por partículas. | Personas excepcionalmente sensibles: Contemplar reducir las actividades que requieran esfuerzo prolongado o intenso al aire libre. Prestar atención a la aparición de síntomas como tos o dificultad para respirar. Esto indica que se debe reducir el esfuerzo. Para el resto de las personas: ¡Es un buen día para realizar actividades al aire libre! |
| 101 – 150 | INSALUBRE PARA GRUPOS SENSIBLES | 155 - 254 | 35.5 - 55.4 | Los grupos sensibles comprenden a personas con cardiopatías o enfermedades pulmonares, adultos mayores, niños y adolescentes. | Grupos sensibles: Reducir las actividades que requieran esfuerzo prolongado o intenso. Está bien realizar actividades al aire libre, pero descanse a menudo y realice actividades menos intensas. Prestar atención a la aparición de síntomas como tos o dificultad para respirar. Las personas asmáticas deben seguir sus planes de acción y tener a mano medicamentos de acción rápida. Si padece de una cardiopatía: Síntomas como palpitaciones, dificultad para respirar o fatiga inusual pueden indicar un problema grave. Si sufre cualquiera de estos síntomas, comuníquese con su proveedor médico. |
| 151 – 200 | INSALUBRE | 255 - 354 | 55.5 -150.4 | Todos | Grupos sensibles: Evitar actividades que requieran esfuerzo prolongado o intenso. Tener en cuenta la posibilidad de realizar las actividades al interior de sus casas. Para el resto de las personas: Reducir las actividades que requieran esfuerzo prolongado o intenso. Descansar a menudo durante las actividades al aire libre. |

Fuente: https://www3.epa.gov/airnow/aqi_brochure_02_14.pdf

5.1. ESTADOS DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA EL PM₁₀

La figura N° 21 muestra las concentraciones promedio de 24 horas para el PM₁₀ asociados a su respectivo estado de la calidad del aire, donde se observó que la estación Santa Anita (STA), presentó 22 días con estado de calidad del aire "Moderado" y 4 días con estado de calidad del aire "Bueno". Asimismo, la estación Campo de Marte (CDM), durante todo el mes de presente estados de calidad del aire "Bueno".

Figura N° 21. Estados de la Calidad del Aire para PM₁₀




| Concentración PM ₁₀ (µg/m ³) | | Estado | Índice de Calidad del Aire - EPA | |
|---|-----|---------------------------------|----------------------------------|-----|
| 0 | 54 | Buena | 0 | 50 |
| 55 | 154 | Moderada | 51 | 100 |
| 155 | 254 | Insalubre para grupos sensibles | 101 | 150 |
| 255 | 354 | Insalubre | 151 | 200 |

5.2. ESTADOS DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA EL PM_{2.5}

La figura N° 22 muestra las concentraciones promedio de 24 horas para el PM_{2.5} asociados a su respectivo estado de la calidad del aire, donde se observó que la estación San Juan de Lurigancho (SJL) presentó todo el mes de enero estados de calidad del aire “Moderados”, mientras que la estación Carabaylo (CRB) presentó 21 días estado “moderado” y un día estado “bueno”. Asimismo, la estación Campo de Marte (CDM), presentó 10 días con estado de calidad del aire “Moderado” y 21 días con estado de calidad del aire “bueno”.

Figura N° 21. Estados de la Calidad del Aire para PM_{2.5}



| Concentración PM _{2.5} (µg/m ³) | | Estado | Índice de Calidad del Aire - EPA | |
|--|-------|---------------------------------|----------------------------------|-----|
| 0 | 12 | Buena | 0 | 50 |
| 12.1 | 35.4 | Moderada | 51 | 100 |
| 35.5 | 55.4 | Insalubre para grupos sensibles | 101 | 150 |
| 55.5 | 150.4 | Insalubre | 151 | 200 |

6. CONCLUSIONES

- Las condiciones meteorológicas influyeron en el comportamiento diario y horario de los contaminantes del aire en el AMLC durante el mes de enero. La disminución de la temperatura e incremento de la humedad relativa en la decadaria 1, favorecieron a la disminución del PM_{10} . En la decadaria 3, el incremento de la temperatura y la disminución de la humedad relativa generaron condiciones para una ligera disminución de $PM_{2.5}$.
- Las concentraciones diarias del PM_{10} mostraron en promedio un incremento en la decadaria 3. Asimismo, las concentraciones diarias del $PM_{2.5}$ fueron mayores en la decadaria 2.
- Los contaminantes gaseosos NO_2 y CO no superaron sus respectivos ECA-aire. Asimismo, realizando una comparación del NO_2 con sus datos históricos (2015-2019) se evidenció una disminución significativa de la concentraciones en el mes de enero 2021.
- El O_3 no superó su respectivo ECA-aire. Asimismo, la estación SJL registró las concentraciones más altas en la decadaria 1.
- Con respecto a los estados de la calidad del aire se pudo apreciar que, el contaminante PM_{10} presentó todos los días un estado "bueno" en la estación CDM durante el mes de enero, mientras que estación Santa Anita (STA) presentó 22 días con un estado "Moderado". Asimismo, el contaminante $PM_{2.5}$ presentó todos los días un estado de calidad del aire "moderado" en la estación SJL y la estación CRB presentó 21 días un estado "moderado", mientras que la estación CDM presentó 21 días un estado "bueno".

7. PERSPECTIVAS DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA EL MES DE FEBRERO 2021

De acuerdo al pronóstico climático⁸, se espera que en el AMLC las temperaturas máximas y mínimas alcancen sus valores normales, lo que favorecería principalmente al incremento gradual de las concentraciones de PM_{10} en las zonas donde existe presencia de polvo y disminución de las concentraciones de $PM_{2.5}$. Sin embargo, dado a que las medidas como el aislamiento social obligatorio se levantaron (trayendo como consecuencia un aumento de las emisiones vehiculares e industriales) se espera que las concentraciones de ambos contaminantes alcancen valores cercano a sus promedios históricos para el mes de febrero 2021.

8. Documento: Boletín climático nacional – febrero 2021 SENAMHI

Para más información sobre el presente informe, contactar con:

Ing. Jhojan Pool Rojas Quincho

jprojas@senamhi.gob.pe

Subdirector de Evaluación del Ambiente Atmosférico

Elaboración

Ing. Francesco Renato Urdanivia Lermo (furdanivia@senamhi.gob.pe)

Ing. Roy Antonio Garay Saravia (rgaray@senamhi.gob.pe)

Mg.Sc. Alan Jesús García Rosales

Ing. Elvis Anthony Medina Dionicio

Apoyo

Tec. Rosalinda Aguirre Almeyda

Para estar informado permanentemente sobre la **EVOLUCIÓN HORARIA DE LOS CONTAMINANTES PRIORITARIOS DEL AIRE** en Lima Metropolitana visita este enlace:

<http://www.senamhi.gob.pe/?p=calidad-de-aire>

Encuentra los últimos **6 BOLETINES MENSUALES DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE** de Lima Metropolitana en el siguiente enlace:

<http://www.senamhi.gob.pe/?p=boletines>

Próxima actualización: 15 de marzo de 2021